

ERCOLE

Fiche d'identité

Nom commercial : **ERCOLE**Composition : **LAMBDA-CYHALOTHRIN 4 g/kg**N° AMM : **2150483**Type d'action : **INSECTICIDES**Formulation : **(GR) GRANULE**Conditionnement : **10kg**

ERCOLE® est un insecticide du sol muticultures à base de lambda-cyhalothrine. ERCOLE® est formulé en microgranulés prêts à l'emploi. Il doit être positionné dans la raie de semis à l'aide d'un microgranulateur fixé sur le semoir. ERCOLE® combine 3 modes d'action : contact, ingestion et tension de vapeur.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Aubergines - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hanneçons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres cucurbitacées à peau comestible	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Autres cucurbitacées à peau non comestible	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
--	---------	---	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Brocolis	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

Carotte	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
---------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de semis.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Céleri rave	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de semis.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Chicorée scarole	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
------------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chicorée-frisée	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Choux de bruxelles	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
--------------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux feuilles	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

Choux pommés	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
--------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux-fleurs	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Choux-raves	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
-------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Concombres	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

Cornichons	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Courgettes	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Cultures ornementales	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1		NC
-----------------------	---------	--	----------	---	--	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Laitue	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

Mâche	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
-------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Maïs	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de semis.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.

Dose :

Maïs doux	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	NC
-----------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de semis.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Melons	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Millet	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	NC
--------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de semis.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obteneur, de l'organisme semencier.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Miscanthus	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de semis.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obteneur, de l'organisme semencier.

Dose :

Moha	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	NC
------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de semis.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obteneur, de l'organisme semencier.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Panais	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de semis.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Pastèques	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
-----------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Persil à grosse racine	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de semis.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Piments - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
-----------------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Poivrons - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de plantation.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Pommes de terre	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
-----------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de plantation.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Porte graine . Potagères, PPAMC et florales	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de semis.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

Potiron	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
---------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de plantation.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Raifort	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de semis.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Roquette	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
----------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Scorsonères	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de semis.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

Soja	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
Uniquement en plein champ.
Application dans la raie de semis.
Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Sorgho	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de semis.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.

Dose :

Tabac	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
-------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de plantation.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Tomates - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de plantation.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

Topinambours	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
--------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :
 Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.
 Uniquement en plein champ.
 Application dans la raie de semis.
 Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
 Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
 Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.
 Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
 Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture		Dose	Max. appli	DAR	ZNT	
Tournesol	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :

Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.

Uniquement en plein champ.

Application dans la raie de semis.

Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

ERCOLE



Mention d'avertissement :

Attention

Mention de danger :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Eliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.

SPe 5 Pour protéger les oiseaux, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol

s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

SPe 6 Pour protéger les oiseaux, récupérer tout produit accidentellement répandu.

DRE

Non Concerné

Détenteur homologation :

SIPCAM OXON SPA

Marque déposée :

SIPCAM OXON SPA

Réglementation transport ADR :

Voir FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.