

REDOUTABLE PLUS

Fiche d'identité

Nom commercial : **REDOUTABLE PLUS**

Composition : **PROPYZAMIDE 400 g/L**

N° AMM : **8400574**

Type d'action : **HERBICIDES**

Formulation : **(SC) SUSPENSION CONCENTREE**

Conditionnement : **5L**

REDOUTABLE PLUS, est une spécialité muticultures et multicybles à base de propyzamide, ayant une efficacité sur de nombreuses graminées et dicotylédones. Utilisé en prélevée des adventices, REDOUTABLE PLUS empêche leur levée. Lorsque les adventices sont traitées en post-levée, leur destruction est plus lente, leur croissance est toutefois bloquée et elles ne sont plus nuisibles pour la culture.

Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Absinthe grande	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Dose : au printemps						
Absinthe petite	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Dose : au printemps						
Achillée millefeuille	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3,75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Arbres arbustes d'ornements	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : 200 à 400 L/ha de bouillie sur les rangs soit 50% de la surface au maximum. Application sur le rang. Autorisé sur toutes les espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées. Dose :						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Arbres arbustes d'ornements	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : 200 à 400 L/ha de bouillie sur les rangs soit 50% de la surface au maximum. Application sur le rang. Autorisé sur toutes les espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées. Dose :						
Arbres arbustes d'ornements	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : 200 à 400 L/ha de bouillie sur les rangs soit 50% de la surface au maximum. Application sur le rang. Autorisé sur toutes les espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées. Dose :						
Armoise	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Arnica	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Artichauts	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	60 jours	5 m
Usage : Dose :						
Balsamite	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Bardane	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Basilic	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						
Belladone	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Bleuet	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Brocolis	Désherbage	Toutes adventices	2,5 L/HA	1	60 jours	5 m
Usage : Dose :						
Cameline	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Période d'application: de novembre à janvier. Respecter une application maximale de 750 g/ha de propyzamide par campagne. Dose : Application à partir du stade 3-4 feuilles.						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Camomille grande	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Camomille romaine	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Dose : au printemps						
Cardons	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Chicorée à café	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	120 jours	5 m
Usage : Dose :						
Chicorée annuelle porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Chicorée bisannuelle porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Chicorée Witloof production de racines	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	120 jours	5 m
Usage : Dose :						
Choux porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux-fleurs	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	60 jours	5 m
Usage : Dose :						
Ciboulette	Désherbage	Toutes adventices	2 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						
Colza d'hiver	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Période d'application: de novembre à janvier. Respecter une application maximale de 750 g/ha de propyzamide par campagne. Dose : Application à partir du stade 3-4 feuilles.						
Dactyle porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	0,6 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Echinacée	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Estragon	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						
Fenouil	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Féverole d'hiver	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	DAR F (BBCH 14)	5 m
Usage : Dose :						
Grindelia	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Iris pale	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Laitue	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	28 jours	5 m
Usage : Uniquement plein champ. Une seule application par an quel que soit le nombre de cycle culturaux. Dose :						
Laitue porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Lavande	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Lavandin	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Légumineuses à petites graines porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Lentilles sèches	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	90 jours	5 m
Usage : Dose :						
Lotier	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Dose :						
Lupin	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	DAR F (BBCH 14)	5 m
Usage : Lupins d'hiver et de printemps. Dose :						
Luzerne	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Dose :						
Mélilot officinal	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Menthe	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Millepertuis perforé	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Moutarde	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Période d'application: de novembre à janvier. Respecter une application maximale de 750 g/ha de propyzamide par campagne. Dose : Application à partir du stade 3-4 feuilles.						
Navette	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Période d'application: de novembre à janvier. Respecter une application maximale de 750 g/ha de propyzamide par campagne. Dose : Application à partir du stade 3-4 feuilles.						
Oignons porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Origan	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						
Pied de chat	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Piloselle	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Pissenlit	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	60 jours	5 m
Usage : Uniquement plein champ. Une seule application par an quel que soit le nombre de cycle culturaux. Dose :						
Poireaux porte-graine	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1		5 m
Usage : Dose :						
Pois chiche	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	90 jours	5 m
Usage : Dose :						
Pois protéagineux d'hiver	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	DAR F (BBCH 14)	5 m
Usage : Dose :						
Pyrèthre de Dalmatie	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Romarin	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Sainfoin	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Dose :						
Sauge sclarée	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Scarole, frisée	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	28 jours	5 m
Usage : Uniquement plein champ. Une seule application par an quelque soit le nombre de cycle culturaux. Dose :						
Soucis officinal	Désherbage	Toutes adventices	3,75 L/HA	1	100 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser sur cette espèce lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale Dose : 3.75 L/ha au printemps et 1,875 L/ha à l'automne						
Thym	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	45 jours	5 m
Usage : Ne pas utiliser lorsqu'elle est utilisée en tant que plante médicinale. Dose :						
Trèfle	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	150 jours	5 m
Usage : Dose :						
Vigne - raisin de cuve	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	180 jours	5 m
Usage : Dose :						

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Vigne - raisin de table	Désherbage	Toutes adventices	1,875 L/HA	1	180 jours	5 m
Usage :						
Dose :						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

REDOUTABLE PLUS



Mention d'avertissement :

Attention

Mention de danger :

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du méthylphénol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P391 Recueillir le produit répandu.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du méthylphénol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H351 Susceptible de provoquer le cancer.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

REDOUTABLE PLUS

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

DRE

48h

Détenteur homologation :

CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S.

Marque déposée :

TRADI-AGRI

Réglementation transport ADR :

Voir FDS

EUH208 Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldéhyde et du methylphenol, sel de sodium, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.